

Score PUCAI

Date : Nom et prénom du patient :

Date de naissance :

Les réponses doivent refléter une moyenne quotidienne des 2 derniers jours. Si les conditions cliniques viennent de changer (par ex. pendant une thérapie intravéneuse intense), les dernières 24 heures doivent être prise en compte. Les patients avec un score de PUCAI de 35 ou plus ont une maladie d'activité modérée à sévère et peuvent être non contrôlés.

Score PUCAI =

Douleurs abdominales

+ Saignement rectal

+ Consistance des selles

+ Nombre de selles par 24h

+ Selles nocturnes (tout épisode causant le réveil)

+ Niveau d'activité

= Total

	Entourer une seule réponse
Douleurs abdominales	
Pas de douleur	0
La douleur peut être ignorée	5
La douleur ne peut pas être ignorée	10
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	+
Saignement rectal	
Pas de sang observé	0
Faible quantité (moins de 50% des selles)	10
Faible quantité (dans les selles molles)	20
Quantité importante (dans plus de 50% du contenu des selles)	30
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	+
Consistance des selles	
Formées/Normales/Solides	0
Partiellement formées/Molles	5
Liquide	10
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	+
Nombre de selles par 24h	
0-2	0
3-5	5
6-8	10
>8	15
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	+
Selles nocturnes (tout épisode causant le réveil)	
Non	0
Oui	10
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	+
Niveau d'activité	
Pas de limitation de l'activité	0
Limitation occasionnelle de l'activité	5
Restriction sévère de l'activité	10
	Inscrire le résultat dans la case <input type="checkbox"/>
	=
	Additionner les résultats inscrits ci-dessus <input type="checkbox"/>
	TOTAL

